

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

Беллатаминал®

**Регистрационный номер: P N001203/01.**

**Торговое название препарата:** Беллатаминал®

**Международное непатентованное название:** нет

**Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой.

**Состав на одну таблетку:**

*Активные вещества:*

Эрготамина тартрат (в пересчете на 100 %) - 0,0003 г

Фенобарбитал - 0,02 г

Красавки сумма алкалоидов (в пересчете на 100%) - 0,0001 г

*Вспомогательные вещества (ядро):*

Сахароза (сахар-рафинад), крахмал картофельный в пересчете на 97 % вещество, повидон (поливинилпирролидон), кальция стеарат (кальций стеариново-кислый) - до получения таблетки-ядра весом 0,1 г

*Вспомогательные вещества (оболочка):*

Сахароза (сахар-рафинад), кремний диоксид коллоидный (аэросил А-380), магния гидроксид карбонат (магния карбонат основной), титана диоксид (титана двуокись), желатин, воск пчелиный, тропеолин О - до получения таблетки, покрытой оболочкой, весом 0,173 г

**Описание**

Таблетки, покрытые оболочкой светло-желтого цвета, двояковыпуклой формы.

**Фармакотерапевтическая группа**

Седативное средство

**АТХ:** N05CB02

**Фармакологические свойства**

Беллатаминал – комбинированный препарат.

Препарат обладает альфа-адреноблокирующим, М- холиноблокирующим и успокаивающим свойствами.

**Показания к применению**

Беллатаминал® применяют при повышенной раздражительности, бессоннице, неврогенных расстройствах менструального цикла, для облегчения зуда при нейродермитах, в комплексной терапии вегето-сосудистой дистонии.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Стенокардия и другие выраженные проявления атеросклероза, спазм периферических артерий, закрытоугольная глаукома, беременность, грудное вскармливание, роды, возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Препарат отпускается по рецепту. Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день после еды. Продолжительность применения препарата составляет от 2 до 4 недель. Возможно проведение повторных курсов лечения после консультации с врачом.

**Побочное действие**

Аллергические реакции, сухость во рту, сонливость, парез аккомодации.

**Передозировка**

Симптомы передозировки: головокружение, вялость, сонливость, тахикардия, расширение зрачков, нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания, атония кишечника, судороги, в тяжелых случаях ступор, кома.

**Первая помощь:** промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Действие препарата усиливают альфа- и бета-адреностимуляторы, никотин.

**Особые указания**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

**Форма выпуска**

Таблетки, покрытые оболочкой. По 10, 30 или 50 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 3, 5 контурных ячейковых упаковок № 10 или 1 контурную ячейковую упаковку № 30 или № 50 вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Список Б.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель /Организация по приему претензий от потребителей:**

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР».

117216, Россия, Москва, ул. Грина, 7. тел./факс (495) 388-47-00